

试卷代号:2112

座位号

中央广播电视大学 2008—2009 学年度第一学期“开放专科”期末考试

护理学基础 试题

2009 年 1 月

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、名词解释(每题 4 分,共 20 分)

1. 应激
2. 体核体温
3. 护理诊断
4. 尿失禁
5. 自体输血是

得分	评卷人

二、填空题(每空 1 分,共 10 分)

1. 1912 年,国际护士学会为纪念_____,决定以她的生日 5 月 12 日作为国际护士节。
2. 焦虑是最常见的一种_____反应,也是护理人员最常遇到的问题。
3. 颅脑手术的患者应取_____或_____卧位。
4. 应用干热灭菌法时,一般物品在_____℃的干热下,经_____小时,可杀死细菌繁殖体及芽胞。
5. 发生青霉素过敏性休克时应立即注射_____的盐酸肾上腺素 0.5~1.0ml。
6. 连续使用超声雾化吸入器,应间隔_____分钟。
7. 大量输入保存期长的库存血易发生_____和_____。

得分	评卷人

三、单项选择题(每题选择一个最佳答案,每题 2 分,共 40 分)

- 对于下列哪一类病人的隔离,不属于保护性隔离? ()
 - 早产婴儿
 - 艾滋病病人
 - 白血病病人
 - 脏器移植病人
 - 大面积烧伤病人
- 下列哪项运动属于无氧运动? ()
 - 游泳
 - 慢跑
 - 举重
 - 跳绳
 - 骑自行车
- 口腔有绿脓杆菌感染时,最有效的漱口液是()。
 - 温开水
 - 0.9%生理盐水
 - 0.1%醋酸溶液
 - 1—3%过氧化氢溶液
 - 1—4%碳酸氢钠溶液
- 下列哪项陈述符合弛张热的特点()
 - 体温一直升高,波动幅度很小
 - 口温在 38~38.9℃,多见于急性感染
 - 一日内体温变化极不规律,且持续时间不定
 - 发热期与正常或正常以下体温期交替有规律地变化
 - 体温在 39℃以上,波动幅度大,24 小时内温差达 2℃以上,但在波动中体温未降至正常
- 进行大便潜血试验检查前 3 天,病人应禁食的食物是()。
 - 猪肝
 - 马铃薯
 - 大白菜
 - 奶类食品
 - 黄豆制品

6. 肝硬化腹水患者宜进()。
- A. 低盐饮食
B. 低蛋白饮食
C. 低脂肪饮食
D. 高脂肪饮食
E. 高热量饮食
7. 碱性药物中毒时,不能使用下列哪种解毒剂洗胃?()
- A. 白醋
B. 牛奶
C. 5%醋酸
D. 蛋清水
E. 2%~4%碳酸氢钠
8. 服磺胺药者需多饮水的原因是()。
- A. 增加药物疗效
B. 避免损害造血系统
C. 减轻服药后引起的恶心
D. 避免影响血液的酸碱度
E. 增加溶解度避免结晶析出
9. 有关疼痛病人护理措施的陈述,不正确的是()。
- A. 麻醉性止痛药用于难以控制的剧烈疼痛
B. 药物性止痛方法是临床解除疼痛的主要手段
C. 非药物止痛方法应与药物止痛方法联合使用
D. 当病人存在疼痛时,应根据情况实施缓解疼痛的措施
E. 给予药物止痛时,开始剂量宜小,以后逐渐加量,以免成瘾
10. 下列有关病人心理社会评估的叙述,不正确的是()。
- A. 心理社会评估所得的资料多为主观资料
B. 心理社会评估是护理评估的重要组成部分
C. 心理社会评估成功与否与护士的沟通能力密切相关
D. 心理社会评估所得的资料很难用正常或异常加以划分
E. 心理社会评估的目的是对病人的生活经历、行为道德进行评论
11. 按照奥瑞姆的自理模式护理病人时,采取何种护理系统取决于()。
- A. 护士的编制
B. 病人的病情
C. 病人的自理需求
D. 病人的自理能力
E. 病人的自理知识

12. 解决自我认同和角色紊乱的矛盾冲突是下列哪一时期的发展任务? ()
- A. 18个月~3岁
B. 3~6岁
C. 6~12岁
D. 12~18岁
E. 18~40岁
13. 腹膜炎患者的最佳体位是()。
- A. 侧卧位
B. 屈膝仰卧位
C. 头低脚高位
D. 俯卧位
E. 半坐卧位
14. 现代医学模式是指()。
- A. 生物医学模式
B. 生理、心理医学模式
C. 生物、心理、社会医学模式
D. 生物、生理、心理医学模式
E. 生物、生理、社会医学模式
15. 下列有关骨损伤时固定的原则, 不正确的是()。
- A. 四肢固定时应露出指(趾)端
B. 夹板与皮肤之间要加垫棉、布或其他物品
C. 用夹板固定时, 固定的范围应包括骨折部的上下两个关节
D. 损伤处有出血时, 应先行止血, 并包扎伤口, 然后再固定骨折
E. 处理开放性骨折时, 应先将刺出的骨折断端送回伤口内, 再行固定
16. 有关清洁面与污染面判断正确的是()。
- A. 接触百日咳病人时戴的口罩: 内面为清洁面, 外面为污染面
B. 接触白血病人时戴的口罩: 内面为清洁面, 外面为污染面
C. 接触甲型病毒肝炎病人时穿的隔离衣: 内面为污染面, 外面为清洁面
D. 接触大面积烧伤病人时穿的隔离衣: 内面为清洁面, 外面为污染面
E. 挂在办公室内的隔离衣: 其内面为清洁面, 外面为污染面
17. 省力杠杆是()。
- A. 阻力点在支点和力点之间
B. 力点在支点和阻力点之间
C. 支点在阻力点和力点之间
D. 阻力点和力点合二为一
E. 支点和力点合二为一

试卷代号:2112

中央广播电视大学 2008—2009 学年度第一学期“开放专科”期末考试

护理学基础 试题答案及评分标准

(供参考)

2009 年 1 月

一、名词解释(每题 4 分,共 20 分)

1. 应激:是指内、外环境中的刺激物作用于个体产生的一种身心紧张状态。
2. 体核体温:即身体内部—胸腔、腹腔和中枢神经的温度,较高且稳定。
3. 护理诊断:是关于个人、家庭、社区对现存的或潜在的健康问题或生命过程的反应的一种临床判断,是护士为达到预期结果选择护理措施的基础,这些预期结果是应由护士负责的。
4. 尿失禁:指膀胱内的尿液不能控制而自行排出的现象。
5. 自体输血:指收集自体血液输还自己身体内。

二、填空题(每空 1 分,共 10 分)

1. 南丁格尔
2. 心理
3. 侧卧位 平卧
4. 160 2
5. 1 : 1000
6. 30
7. 酸中毒 高钾血症

三、单项选择题(每题选择一个最佳答案,每题 2 分,共 40 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. C | 3. C | 4. E | 5. A |
| 6. A | 7. E | 8. E | 9. E | 10. E |
| 11. D | 12. D | 13. E | 14. C | 15. E |
| 16. A | 17. A | 18. C | 19. E | 20. C |

四、问答题(14分)

1. (每项1分,共9分)(1)不必过多的考虑价值观,对病人微小的愿望亦加以重视。

(2)对临终病人要求解除疼痛的愿望应全力以赴。

(3)不要回避病人的目光,应作出有呼应的姿态。

(4)语言交流与非语言交流并用。

(5)注意病人平时的饮食习惯与嗜好。

(6)指导病人通过生活方式的改变作自我护理,并在这种生活方式中平稳地完成临终护理。

(7)直至最后都要使病人一直抱有希望。

(8)理解病人,倾听病人的叙述。

(9)认真进行对已死者的死后护理。

2. (每项1分,共5分)(1)解除病人的焦虑,分散其注意力;

(2)协助采取适当体位,放松局部肌肉;

(3)注射时二快一慢,即进针、拔针快,推药慢;给儿童注射时应三快;

(4)刺激性强的药物应选择较粗、较长的针头,进针要深;

(5)多种药物同时注射,应先注射,推药要慢。

五、论述题(16分)

①原因:由于输液量过快,在短时间内输入过多液体,使循环血容量急剧增加致心脏负荷过重。(3分)

②主要临床表现:心衰的症状及肺水肿的表现(4分)。病人突感胸闷、心前区有压迫感或疼痛;呼吸急促、咳嗽、咳粉红色泡沫痰,严重者可从口鼻涌出大量泡沫样血性液体;肺部可遍及湿罗音。面色苍白、出冷汗,脉搏快且弱等。(3分)

③处理原则:立即停止输液并通知医生(2分);采取措施减少回心血量(病情允许可采取端坐位;遵医嘱给予扩血管药,扩张周围血管,必要时四肢轮扎、静脉放血等)(2分);高流量吸氧,湿化瓶内注入50%~70%酒精(1分);利尿强心(1分)