

铜陵电大

试卷代号:2394

座位号

中央广播电视大学 2008—2009 学年度第一学期“开放专科”期末考试

内科护理学 试题

2009 年 1 月

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、单项选择题(每题 2 分,共 40 分)

1. 患者男,68 岁,房颤 20 年,服用地高辛控制心室率 5 年,近 3 天患者突然出现恶心,呕吐等症状,同时伴有心悸、头痛、头晕,视物模糊,查心电图:室性早搏二联律,该患者可能发生了()。

- A. 消化性溃疡
B. 心绞痛
C. 洋地黄类药物中毒
D. 高血压

2. 护士给予慢性心衰患者的饮食指导不妥的是()。

- A. 应少量多餐
B. 饮食应清淡、易消化
C. 每日摄盐量应少于 5g
D. 增加味精和酱油等调味品,以促进食欲

3. 支气管扩张症最常见的病因是()。

- A. 婴幼儿期的麻疹、支气管肺炎
B. 肺结核
C. COPD
D. 支气管肺癌

4. 诊断肺结核最可靠的依据是()。

- A. 低热、盗汗
B. X 线胸片有空洞
C. 结核菌素试验阳性
D. 痰结核菌阳性

铜陵电大

5. 预防支气管哮喘发作最有效的措施是()。
- A. 按医嘱定时服药
B. 回避激发因素
C. 吸入糖皮质激素
D. 每日用风速仪监测病情变化
6. 引起上消化道出血最常见的病因是()。
- A. 胃癌
B. 食道静脉曲张破裂出血
C. 急性糜烂性胃炎
D. 消化性溃疡
7. 西咪替丁治疗消化性溃疡的机理是()。
- A. 质子泵阻滞剂
B. H_2 受体拮抗剂
C. 制酸剂
D. 增加粘膜抵抗力
8. 下面关于胃溃疡的叙述不正确的是()。
- A. 可见于任何年龄,青少年多
B. 慢性病程
C. 周期性发作
D. 节律性疼痛
9. 腹式呼吸和缩唇呼气的方法不妥的是()。
- A. 由鼻吸气
B. 吸气时腹肌收缩
C. 经口呼气
D. 呼气时缩拢口唇
10. 我国最常见的贫血是()。
- A. 营养性巨幼细胞贫血
B. 再生障碍性贫血
C. 缺铁性贫血
D. 恶性贫血
11. 血小板在循环血中的寿命为()。
- A. 1~3天
B. 4~5天
C. 6~7天
D. 8~11天
12. 急性有机磷杀虫药中毒主要死因是()。
- A. 周围循环衰竭
B. 脑水肿
C. 呼吸衰竭
D. 肝肾功能衰竭
13. 脑出血的部位最常见的是()。
- A. 脑室出血
B. 脑桥出血
C. 小脑出血
D. 基底节出血

铜陵电大

14. 癫痫持续状态时的护理措施不妥的是()。

- A. 遵医嘱应用安定,迅速控制发作
- B. 用力按压肢体制止抽搐
- C. 将毛巾或外裹纱布的压舌板塞入一侧白齿间
- D. 解开衣领、腰带,避免影响呼吸

15. 使用阿托品、解磷定治疗有机磷农药中毒,患者神志转清醒、呼吸困难减轻、肺部湿罗音减少。约半小时左右,患者突然再次出现意识模糊、躁动、抽搐,体温高达 39.5℃。该患者可能发生了()。

- A. 脑出血
- B. 脑水肿
- C. 解磷定中毒
- D. 阿托品中毒

16. 过敏性紫癜最常见的临床类型为()。

- A. 腹型
- B. 关节型
- C. 紫癜型
- D. 肾型

17. 下列药物中属于保钾利尿剂的是()。

- A. 依他尼酸(利尿酸)
- B. 氢氯甲噻嗪
- C. 呋塞米(速尿)
- D. 安体舒通

18. 门静脉高压症的临床表现不包括()。

- A. 腹水
- B. 肝掌、蜘蛛痣
- C. 脾大、脾功能亢进
- D. 腹壁脐周静脉曲张

19. 支气管哮喘重度急性发作期患者使用药物不正确的是()。

- A. 雾化吸入 β_2 激动剂
- B. 静脉滴注沙丁胺醇
- C. 雾化吸入抗胆碱药
- D. 吸入倍氯米松气雾剂

20. 由于心排血量突然下降出现的晕厥称为()。

- A. 病态窦房结综合征
- B. 阿-斯综合征
- C. 休克
- D. 预激综合征

铜陵电大

得分	评卷人

二、名词解释(每题 4 分,共 20 分)

1. 肺性脑病
2. 肝性脑病
3. 肾性骨病
4. 白血病
5. 系统性红斑狼疮(SLE)

得分	评卷人

三、简答题(任选 3 题,每题 8 分,共 24 分,多答不加分)

1. 简述引起脑血管疾病的危险因素。
2. 简述对急性肾盂肾炎病人的护理措施及预防复发的措施。
3. 列出对肝硬化患者休息、饮食护理要点。
4. 简述冠心病心绞痛的典型临床表现。

得分	评卷人

四、论述题(16 分)

患者,男性,40岁,临床诊断支气管扩张,患者咳大量脓痰,拟进行体位引流,请写出对其进行护理的措施。

铜陵电大

试卷代号:2394

中央广播电视大学 2008—2009 学年度第一学期“开放专科”期末考试

内科护理学 试题答案及评分标准

(供参考)

2009 年 1 月

一、单项选择题(每题 2 分,共 40 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. A | 4. D | 5. B |
| 6. D | 7. B | 8. A | 9. B | 10. C |
| 11. D | 12. C | 13. D | 14. B | 15. D |
| 16. C | 17. D | 18. B | 19. D | 20. B |

二、名词解释(每题 4 分,共 20 分)

1. 肺性脑病:因呼吸功能不全导致缺氧和二氧化碳滞留而引起的神经系统、精神障碍的综合征。

2. 肝性脑病:是严重肝病引起的,以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合征,其主要临床表现为意识障碍、行为失常和昏迷。

3. 肾性骨病:慢性肾衰可引起肾性骨营养不良症,又称肾性骨病。常见表现包括:纤维囊性骨炎,肾性骨软化症(肾性佝偻病),骨质疏松症及肾性骨硬化症。

4. 白血病:白血病是一类原因未明的造血干细胞的恶性克隆性疾病。白血病细胞在骨髓及其他造血组织中弥漫性、恶性增生,浸润破坏体内脏器和组织,而正常造血受抑制,临床上产生各种症状和体征。

5. 系统性红斑狼疮(SLE):是一累及全身多个系统的自身免疫性疾病,血清中出现多种自身抗体,并有明显的免疫紊乱。

三、简答题(任选 3 题,每题 8 分,共 24 分,多答不加分)

1. 简述引起脑血管疾病的危险因素。

(1)可干预的危险因素:高血压、心脏病、糖尿病、TIA 或脑卒中是目前公认的最重要的危险因素。(4 分)

另外,高脂血症、吸烟和酗酒、超重、体力活动减少、口服避孕药、饮食、眼底动脉硬化、无症状性颈动脉杂音(狭窄)、同型半胱氨酸血症等,均是增加脑血管疾病发生的危险因素。(2 分)

(2)不可干预的危险因素:年龄、性别、种族、遗传、气候等。(2 分)

铜陵电大

2. 简述对急性肾盂肾炎病人的护理措施及预防复发的措施。

急性肾盂肾炎病人的护理措施:

(1) 第一周应卧床休息。(2分)

(2) 饮食及饮水护理:急性期进食清淡并含丰富营养的食物,补充多种维生素。多饮水,勤排尿。(2分)

(3) 高热护理:体温大于 39°C 时,需进行物理降温。(1分)

(4) 疼痛护理:减轻疼痛的方法为卧床休息,采用双腿屈曲位,尽量不要站立或坐位。

(1分)

预防复发措施:(任答2项,各1分)

(1) 向病人说明做好个人卫生,勤洗澡,勤换内衣裤,发现尿路感染时要及时就医。

(2) 患感冒要及时治疗,不可过度劳累,平时多饮水、不憋尿是简便而有效的预防措施。

(3) 若在性生活后易患尿路感染,可在房事后排尿,并口服抗菌药物。

3. 列出对肝硬化患者休息、饮食护理要点。

(1) 休息:①代偿期患者可参加轻体力活动,避免过度疲劳。(2分)②失代偿期患者应卧床休息为主,以降低肝脏的代谢率,增加肝脏的血流量,有利于肝细胞修复。(2分)

(2) 饮食:①高热量、高蛋白、高维生素、易消化的食物,用醋、糖、色、香、味提高病人食欲,少量多餐,以保证营养。(2分)②应禁酒及避免食入粗糙或刺激性食物。(1分)③血氨偏高者遵医嘱限制或禁食蛋白质,待病情好转后再逐渐增加蛋白质摄入量;有腹水时应给予低盐或无盐饮食,限制进水量。(1分)

4. 简述冠心病心绞痛的典型临床表现。

(1) 典型的心绞痛常因体力活动、情绪激动而诱发,也有在饱餐或休息时发病。(3分)

(2) 主要症状为胸骨后压迫性不适或为紧缩、压榨、堵塞感,也可有烧灼感,放射至左肩、左上肢内侧,病人被迫停止原有动作。(3分)

(3) 休息或含服硝酸甘油后 1~5 分钟内缓解。(1分)

(4) 发作时,病人面色苍白,出冷汗,心率增快,血压升高。(1分)

四、论述题(16分)

患者,男性,40岁,临床诊断支气管扩张,患者咳大量脓痰,拟进行体位引流,请写出对其进行护理的措施。

答:(1) 确定引流体位:根据身体评估时湿罗音集中的部位(1分)、X线胸片显示的病变部位(1分),再结合病人自身的体验(何种姿势有利于咳痰)(2分),来确定引流体位。体位选择的原则是使病变部位处于高处(3分),引流支气管开口向下(2分),以利于痰液流入大气管和气管排出。(定期翻身也有一定的体位引流作用)(1分)

(2) 引流时间:引流通常在餐前进行(1分),每日 2~3 次(1分),每次持续 5~15 分钟(1分)。

(3) 加强引流效果:引流前应给予超声雾化吸入(1分),引流同时应辅以胸部扣击等(2分)。