试卷代号:22403

座位号

国家开放大学2024年秋季学期期末统一考试

外科护理学 试题

2025年1月

学 号: _____

姓 名: _____

考点名称: _____

注意事项:

1. 将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
2. 仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
3. 用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(本题共50小题,每小题2分,共100分。请在给出的选项中,选出最符合题目要求的一项)

1. 关于现代外科护理学的概念,下列叙述正确的是()
A. 研究外科领域对人的整体护理 B. 研究围手术期病人的护理方法
C. 研究外科护理的知识和技术 D. 研究外科护士的职责与任务
E. 研究外科病人恢复健康的护理方法
2. 下列关于肠外营养的护理措施正确的是()
A. 首选中心静脉途径
B. 可经中心静脉输血
C. 不要经中心静脉导管取血
D. 怀疑导管性脓毒症时,首选抗菌药治疗
E. 葡萄糖、氨基酸和脂肪乳剂最好单独输注
3. 经鼻胃管灌注要素膳时病人最好取()
A. 半卧位 B. 左侧卧位
C. 右侧卧位 D. 垫枕平卧位
E. 去枕平卧位
4. 无菌环境下配置的要素膳,放置于4℃冰箱冷藏,其有效时间应小于()
A. 4小时 B. 8小时
C. 12小时 D. 24小时
E. 36小时
5. 抗休克最重要的治疗措施是()
A. 积极处理原发疾病 B. 及时纠正酸碱平衡失调
C. 早期应用血管活性药物 D. 及时、快速、足量补充血容量
E. 应用强心药
6. 若休克病人组织灌流恢复,其最低尿量标准是()
A. 50mL/h B. 40mL/h
C. 30mL/h D. 20mL/h
E. 10mL/h
7. 预防腰麻术后头痛的主要措施是()
A. 注意保暖 B. 心理护理
C. 减少术中输液量 D. 垫枕平卧4~6小时
E. 去枕平卧6~8小时

8. 手术前禁食的目的是()
- A. 使消化道充分休息
B. 防止术后排便污染手术野
C. 防止术中呕吐引起窒息
D. 防止术后腹胀
E. 防止术后便秘
9. 手术者穿好无菌手术衣、戴好无菌手套后,手术未开始,双手应置于()
- A. 胸前
B. 腹前
C. 夹在腋下
D. 双手下垂
E. 背后
10. 女性,61岁,行毕Ⅱ式胃大部切除术后第5天,突然出现体温升高至39℃,呼吸困难,听诊肺部呼吸音减弱,有湿啰音。应考虑为()
- A. 肺炎、肺不张
B. 膈下脓肿
C. 十二指肠瘘
D. 肺水肿
E. 呼吸衰竭
11. 全脊椎麻醉的主要危险是()
- A. 恶心、呕吐
B. 剧烈头痛
C. 呼吸、心跳骤停
D. 麻醉作用持久
E. 导致截瘫
12. 脓肿形成后应尽早()
- A. 理疗
B. 切开引流
C. 反复抽脓
D. 应用抗菌药物
E. 中药外敷
13. 治疗破伤风早期大量应用破伤风抗毒素的目的是()
- A. 杀死破伤风梭菌芽胞
B. 抑制破伤风梭菌生长
C. 抑制破伤风梭菌产生毒素
D. 中和血液中游离子毒素
E. 中和已与神经组织结合的毒素
14. 危险三角区的疖,挤压后容易导致的严重并发症是()
- A. 毒血症
B. 菌血症
C. 脓毒症
D. 颅内海绵状静脉窦炎
E. 休克
15. 甲状腺癌病人手术后手脚麻木的原因是()
- A. 术中误伤喉返神经
B. 呼吸困难
C. 术中损伤甲状旁腺
D. 术后低甲状腺素水平
E. 术后感染

16. 女性,37岁,甲状腺大部切除术,术后3h突然窒息,面部青紫,颈部切口下肿胀,其原因是()
- A. 出血
B. 粘痰堵塞咽喉部
C. 分泌物堵塞气管
D. 气管塌陷
E. 喉返神经损伤
17. 甲亢病人术前需要服用的减少甲状腺素合成的药物是()
- A. 阿托品
B. 普萘洛尔
C. 硫脲类药物
D. 甲状腺素
E. 复方碘化钾
18. 乳腺癌最早出现的症状是()
- A. 乳房增大
B. 乳头凹陷
C. 无痛性肿块
D. 橘皮样改变
E. 两侧乳头不对称
19. 乳癌根治术后病人的护理措施中不正确的是()
- A. 抬高患侧上肢
B. 患侧胸壁加压包扎
C. 保持引流管通畅
D. 早期活动患肢
E. 不在患肢测血压
20. 乳腺癌病人术后患侧上肢功能锻炼应达到的目的是()
- A. 手能摸到同侧耳朵
B. 肩能平举
C. 肘能屈伸
D. 手能摸到对侧肩部
E. 手经头能摸到对侧耳朵
21. 乳腺癌术后观察到患侧皮肤呈青紫色伴皮肤温度降低、脉搏不能扪及,提示()
- A. 皮瓣下出血
B. 腋部血管受压
C. 引流管堵塞
D. 胸带加压包扎过松
E. 伤口感染
22. 乳房自我检查时,不正确的方法是()
- A. 病人取坐位,两臂自然下垂
B. 手指掌面平放于乳房上顺序触诊
C. 依次用手指抓捏检查乳房
D. 依次检查乳房的五个区域
E. 包括应检查两侧腋窝淋巴结
23. 乳房自我检查适宜的时间是在月经周期的第()
- A. 1~2天
B. 3~5天
C. 5~7天
D. 7~10天
E. 10~12天

24. 急性腹膜炎适宜非手术继续观察的情况是()
- A. 原发病灶病变严重 B. 腹胀加重,肠鸣音消失
C. 腹膜炎体征局限 D. 体温下降而脉搏加快
E. 脉搏、体温和血象持续升高
25. 男性,因急性阑尾炎行阑尾切除术,术后 4 天出现下腹坠胀、尿频、里急后重,可能的诊断是()
- A. 膈下脓肿 B. 切口感染
C. 肠间隙脓肿 D. 盆腔脓肿
E. 肠梗阻
26. 为了缓解腹部损伤病人的疼痛,可采取的措施不包括()
- A. 绝对卧床休息
B. 不随意搬动患者
C. 疑有空腔脏器穿孔者,应禁食、胃肠减压
D. 禁止灌肠
E. 立即使用吗啡类镇痛药
27. 男性,30 岁,餐后 1 小时,被车撞伤中上腹部,感上腹部剧烈疼痛呈持续性刀割样,短时间内腹痛逐渐扩至全腹,左上腹明显压痛、反跳痛、肌紧张,X 线检查示膈下有游离气体。该病人可能出现的问题是()
- A. 胃肠破裂 B. 脾破裂
C. 肝破裂 D. 胰破裂
E. 肾破裂
28. 男性,56 岁,行胃大部毕 II 式术后 1 个月,常于进食 20~30 分钟后出现上腹饱胀、恶心、心悸、头晕、乏力,应首先考虑给予()
- A. 胃肠减压 B. 镇静剂
C. 调节饮食及餐后平卧 20~30 分钟 D. 以流质饮食为主
E. 禁食、输液
29. 男性,56 岁,因高度怀疑肠梗阻收住院。入院观察 3 天后症状未缓解,给予“腹腔探查术+肠粘连松解术”,明确诊断为粘连性肠梗阻,术中见近端空肠扩张,肠壁增厚、水肿,有粘连系带压迫肠管,约 8cm 肠段发黑坏死。以下关于该病人术后护理措施的叙述,不正确的是()
- A. 应保持适当的卧位 B. 饮食从流质开始
C. 保证有效的胃肠减压 D. 密切观察病情变化
E. 预防并发症的发生

30. 原发性肝癌肝区疼痛的特点是()
- A. 间歇性隐痛 B. 持续性胀痛
C. 阵发性绞痛 D. 刀割样疼痛
E. 烧灼样疼痛
31. Charcot 三联征是()
- A. 黄疸、肝大、血压下降 B. 腹痛、寒战高热、黄疸
C. 腹痛、肝大、黄疸 D. 昏迷、高热、黄疸
E. 腹痛、黄疸、昏迷
32. 肠梗阻非手术治疗首要的措施是()
- A. 抗感染 B. 纠正水电解质失衡
C. 胃肠减压 D. 针灸
E. 中医中药
33. T 管引流病人的护理不正确的是()
- A. 妥善固定 B. 观察引流液的量和性质
C. 必要时生理盐水冲洗导管 D. 引流通畅可 3~5 天拔管
E. 保持引流通畅
34. 全肺切除术后夹闭胸腔闭式引流管的目的是()
- A. 重建胸腔负压 B. 排出积气
C. 排出积液 D. 调节纵隔两侧胸腔压力
E. 便于观察病情
35. 食管癌病人最常见和最典型的症状是()
- A. 进食时的轻微哽噎感 B. 食物通过时的停滞感或异物感
C. 胸骨后疼痛 D. 进行性吞咽困难
E. 呕吐和误吸
36. 有关下肢深静脉血栓非手术治疗护理及术前护理措施,不正确的是()
- A. 指导病人严格戒烟
B. 进食低脂、高纤维素食物,多喝水
C. 溶栓或抗凝治疗期间监测病人的凝血功能
D. 术后多卧床,不宜早期离床活动
E. 注意观察患肢动脉搏动和皮肤温度变化
37. 动脉硬化闭塞症 III 期的典型表现是()
- A. 静息痛 B. 间歇性跛行
C. 足背动脉搏动减弱 D. 患肢麻木发凉
E. 足趾溃疡坏死

38. 硬脑膜外血肿病人意识障碍的典型表现是()
- A. 短暂昏迷 B. 中间清醒期
C. 持续昏迷 D. 昏迷程度时重时轻
E. 昏迷进行性加重
39. 诊断颅底骨折最主要的依据是()
- A. 意识障碍 B. 头皮出血
C. 脑脊液漏 D. 颅底骨质凹陷
E. 脑脊液含血
40. 下列关于冬眠低温治疗期间的护理的叙述不正确的是()
- A. 冬眠期间不宜移动体位
B. 通常体温降至肛温 $32\sim 34^{\circ}\text{C}$ 较为理想
C. 收缩压低于 13.3kPa 应停止给药
D. 复温时应先停止使用冬眠药物
E. 降温前先给病人使用冬眠药物
41. 可采取非手术治疗的肾损伤类型是()
- A. 肾挫伤 B. 肾全层裂伤
C. 肾蒂血管裂伤 D. 严重肾部分裂伤
E. 开放性损伤
42. 男性, 24 岁。单位体检时发现右肾盂内结石, 直径 0.5cm , 经非手术治疗, 护士嘱其大量饮水, 其主要目的是()
- A. 预防泌尿系感染 B. 稀释尿液、减少晶体沉淀
C. 增加尿量, 利于结石排出 D. 解除尿路梗阻
E. 减少尿路损伤
43. 治疗良性前列腺增生的最重要的方法是()
- A. 观察等待
B. 药物治疗
C. 经尿道前列腺切除术
D. 微创手术治疗
E. 尿潴留时先行导尿或耻骨上膀胱造瘘
44. 膀胱癌最常见的病理类型为()
- A. 磷状细胞癌 B. 尿路上皮癌
C. 腺癌 D. 黏液细胞癌
E. 小细胞癌

45. 对使用石膏绷带病人的护理措施中正确的是()
- A. 四肢石膏包扎时要包住手指或足趾
B. 石膏干固后关节部位可以承受较大弯曲力
C. 石膏未干前搬动病人时应用手掌平托
D. 若石膏内皮肤瘙痒, 可将物品伸入石膏内搔抓
E. 石膏污染时可用毛巾蘸多量清水擦洗
46. 腰椎间盘突出症病人腰部活动时, 最明显受限的动作是()
- A. 前屈 B. 后伸
C. 患侧倾斜 D. 健侧倾斜
E. 左右旋转
47. 腰椎间盘突出症的好发部位是()
- A. $L_1\sim 2$ 椎间盘和 $L_2\sim 3$ 椎间盘 B. $L_2\sim 3$ 椎间盘和 $L_3\sim 4$ 椎间盘
C. $L_3\sim 4$ 椎间盘和 $L_4\sim 5$ 椎间盘 D. $L_4\sim 5$ 椎间盘和 $L_5\sim S_1$ 椎间盘
E. $L_5\sim S_1$ 椎间盘和 $S_1\sim 2$ 椎间盘
48. 眩晕和猝倒主要见于()
- A. 神经根型颈椎病 B. 脊髓型颈椎病
C. 椎动脉型颈椎病 D. 交感神经型颈椎病
E. 混合型颈椎病
49. 颈椎病发生的基本原因是()
- A. 颈椎间盘退行性变 B. 发育性颈椎管狭窄
C. 急性颈部损伤 D. 颈部肌肉痉挛
E. 颈椎不稳
50. 颈椎前路手术后最危急的并发症是()
- A. 呼吸困难 B. 喉头水肿
C. 声音嘶哑 D. 伤口出血
E. 植骨块脱出

试卷代号:22403

国家开放大学2024年秋季学期期末统一考试

外科护理学 试题答案及评分标准

(供参考)

2025年1月

一、单项选择题(本题共50小题,每小题2分,共100分。请在给出的选项中,选出最符合题目要求的一项)

1. A	2. C	3. A	4. D	5. D
6. C	7. E	8. C	9. A	10. A
11. C	12. B	13. D	14. D	15. C
16. A	17. C	18. C	19. D	20. E
21. B	22. C	23. D	24. C	25. D
26. E	27. A	28. C	29. B	30. B
31. B	32. C	33. D	34. D	35. D
36. D	37. A	38. B	39. C	40. D
41. A	42. C	43. C	44. B	45. C
46. A	47. D	48. C	49. A	50. A