

试卷代号:11475

座位号

国家开放大学2024年秋季学期期末统一考试

药物治疗学(本) 试题

2025 年 1 月

学 号:_____

姓 名:_____

考点名称:_____

注意事项:

1. 将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
2. 仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
3. 用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(每题 2 分,共 80 分)

1. RCT 的含义是()。
A. 专家的会诊意见
B. 队列研究
C. 随机对照试验
D. 病例对照研究
2. 对影响药物治疗的病理因素的叙述,不正确的是()。
A. 以肝脏代谢为主的药物,在肝脏衰竭时 $T_{1/2}$ 明显延长
B. 以肾排泄为主的药物,在肾衰竭时 $T_{1/2}$ 明显缩短
C. 心力衰竭可导致全身脏器淤血,使药物的 $T_{1/2}$ 明显延长
D. 干扰胃肠道功能的疾病可改变口服药物的吸收过程
3. 蛋白尿指尿液中蛋白质含量超过()。
A. 10mg/24h
B. 100mg/24h
C. 150mg/24h
D. 1000mg/24h
4. 不属于冠心病风险因素的是()。
A. 甘油三酯水平增高
B. 胆固醇水平增高
C. 高密度脂蛋白胆固醇增高
D. 低密度脂蛋白胆固醇水平增高
5. 成人正常血小板计数参考范围为()。
A. $(100\sim300)\times10^9/L$
B. $(100\sim300)\times10^{12}/L$
C. $(4\sim10)\times10^{12}/L$
D. $(4\sim10)\times10^9/L$
6. 关于利尿剂的叙述,错误的是()。
A. 代表药物有呋塞米、螺内酯、氢氯噻嗪等
B. 痛风者及肾功能不全者慎用
C. 保钾利尿剂常与 ACEI 联用,可减轻后者的不良反应
D. 适用于轻、中度高血压
7. 洋地黄类药物的禁忌证不包括()。
A. 病态窦房结综合征
B. 预激综合征伴房颤或心房扑动
C. 梗阻性肥厚型心肌病
D. 心动过速
8. 关于抗心律失常药物用于房颤,不正确的是()。
A. 可减轻房颤的相关症状
B. 维持窦性心律的疗效为中等程度
C. 如果一种抗心律失常药物治疗“无效”,可考虑换用其他抗心律失常药物
D. 选择抗心律失常药物时,优先考虑有效性
9. 与伪麻黄碱合用可能造成“重复用药”的是()。
A. 泰诺
B. 氯苯那敏
C. 布洛芬
D. 泰诺林

10. 关于华法林的使用,不正确的是()。
- A. 需要定期检测 INR B. 过量容易引起出血
C. 食物对华法林的作用影响小 D. 剂量不足容易引起栓塞
11. 有关吸入型短效 β_2 受体激动剂的叙述,不正确的是()。
- A. 是缓解轻一中度急性哮喘症状的首选药物
B. 应按需间歇使用
C. 不宜长期、单一使用
D. 是长期治疗持续性哮喘的首选药物
12. 关于治疗 COPD 的支气管扩张剂的叙述,不正确的是()。
- A. 短期按需应用可缓解症状 B. 是控制 COPD 症状的主要药物
C. 长期规律应用可预防和减轻症状 D. 可使所有患者的 FEV₁ 得到改善
13. 治疗肺结核的一线药物不包括()。
- A. 异烟肼 B. 利福平
C. 乙胺丁醇 D. 链霉素
14. 他汀类药物对缺血性脑卒中患者的作用不包括()。
- A. 预防脑血管痉挛 B. 抗动脉粥样硬化
C. 预防脑梗死再发 D. 降血脂
15. 进入中枢神经系统转变为多巴胺起作用的抗帕金森病药是()。
- A. 左旋多巴 B. 卡比多巴
C. 金刚烷胺 D. 溴隐亭
16. AD 患者在治疗过程中出现幻觉、妄想等精神症状,可以选用的药物是()。
- A. 氯硝西泮 B. 奥氮平
C. 氟西汀 D. 唑吡坦
17. 关于失眠治疗的叙述,错误的是()。
- A. 入睡困难一般可使用短效抗失眠药物
B. 睡眠维持障碍可用中、长效抗失眠药物
C. 对于急性失眠,不应使用药物治疗,以免形成药物依赖
D. 超过 4 周的药物干预需要每个月定期评估
18. 精神分裂症最主要、最本质的症状是()。
- A. 感知觉障碍 B. 思维障碍
C. 情感障碍 D. 意志和行为障碍
19. 临床上最常用的抗抑郁药是()。
- A. 单胺氧化酶抑制剂 B. 选择性 5-HT 再摄取抑制剂
C. 三环类抗抑郁药 D. 四环类抗抑郁药

20. 属于 H₂ 受体阻滞剂的药物是()。
- A. 雷尼替丁 B. 奥美拉唑
C. 氢氧化镁 D. 吉法酯
21. 关于左甲状腺素钠片的叙述,不正确的是()。
- A. 治疗的剂量取决于患者甲减的程度、病因、年龄、性别、体重和个体差异
B. 半衰期约 7 天,口服吸收约 70%,故可每天早餐前 30~60min 服药一次
C. 因其半衰期较长,每天什么时候服用都可以
D. 替代治疗后 4~8 周监测血清甲状腺激素,治疗达标后,每 6~12 个月复查一次
22. 最适宜治疗巨幼细胞性贫血患者的药物是()。
- A. 铁剂及维生素 B₁₂ B. 叶酸及维生素 D
C. 叶酸及维生素 B₁ D. 叶酸及维生素 B₁₂
23. 维生素 K₁ 的作用是()。
- A. 抑制血小板聚集 B. 促进四氢叶酸类辅酶的循环利用
C. 治疗抗凝药过量引起的出血 D. 促进纤溶
24. 糖尿病综合管理的基本原则,错误的是()。
- A. 早期治疗 B. 短期治疗
C. 综合治疗 D. 措施个体化
25. 肾病综合征的特征性表现是()。
- A. 大量蛋白尿 B. 低蛋白血症
C. 水肿 D. 高脂血症
26. 关于治疗甲亢药物的说法,不正确的是()。
- A. 适用于甲亢患者的初始治疗
B. 疗效较肯定,但仅能获得 40%~60%的治愈率
C. 易导致永久性甲减
D. 停药后的复发率较高
27. 尿路感染最常见的细菌为()。
- A. 黏质沙雷菌 B. 大肠埃希菌
C. 肠球菌 D. 变形杆菌
28. 对于门诊就诊的急性肾盂肾炎患者,宜选用的药物是()。
- A. 呋喃妥因 B. 头孢氨苄
C. 阿莫西林/克拉维酸 D. 头孢唑林

29. 国际疼痛学会关于疼痛的定义,正确的是()。
- A. 是机体面临刺激或疾病的信号
B. 是机体对创伤或疾病的反应机制,也是疾病的症状
C. 是组织损伤或类似潜在的组织损伤所引起的不愉快的感觉和情感体验
D. 由外界创伤引起的机体损伤
30. 属于强阿片药物的是()。
- A. 可待因
B. 双氢可待因
C. 芬太尼
D. 曲马多
31. 癌症患者长期使用阿片类止痛药时,首选的给药途径是()。
- A. 口服给药
B. 透皮吸收途径给药
C. 临时皮下注射用药
D. 自控镇痛给药
32. 治疗类风湿关节炎的药物中,甲氨蝶呤给药频率为()。
- A. 每天3次
B. 每天1次
C. 每周1次
D. 每月1次
33. 作为SLE的基础治疗药物,应长期维持使用的是()。
- A. 羟氯喹
B. 吗替麦考酚酯
C. 他克莫司
D. 雷公藤多苷
34. 关于对治疗骨关节炎的NSAID的描述,错误的是()。
- A. 有2~3种胃肠道危险因素存在时,应加用预防溃疡病的药物
B. 可同时使用两种或两种以上的NSAID
C. 尽量避免不必要的大剂量、长期应用NSAID
D. 用药期间不宜饮酒
35. 全部为抑制骨吸收的一组药物是()。
- A. 雌激素、双膦酸盐类、氟化物
B. 双膦酸盐类、降钙素、雌激素受体调节剂
C. 雌激素、双膦酸盐类、维生素K
D. 雌激素、双膦酸盐类、活性维生素D
36. 关于阿仑膦酸钠的叙述,错误的是()。
- A. 是第三代氨基双膦酸盐类骨吸收抑制剂
B. 抗骨吸收作用较依替膦酸二钠强1000倍
C. 服药后30min内可躺卧
D. 患者应在每周的固定一天服用本品

37. 化脓性中耳炎的抗感染治疗,不可选择的抗菌药物是()。

A. 氨基糖苷类
B. 青霉素类
C. 头孢菌素类
D. 硝基咪唑类

38. 急性鼻炎最常见的致病病毒是()。

A. 柯萨奇病毒
B. 鼻病毒
C. 流感病毒
D. 冠状病毒

39. 药疹治疗的首要措施是()。

A. 应用大剂量糖皮质激素
B. 输血促进药物排泄
C. 停用致敏药物
D. 应用激素并同时用抗菌药物

40. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是()。

A. 缬沙坦
B. 呋塞米
C. 硝苯地平
D. 阿替洛尔

二、配伍选择题(每一组有2—4题,共用四个备选项。备选项可重复选用,也可不选用。每题只有一个最佳答案。每题2分,共20分)

- A. 有助于缓解感冒引起的鼻塞、流涕和打喷嚏等症状
B. 有助于消除或减轻普通感冒患者的打喷嚏和流涕等症状
C. 针对普通感冒患者的发热、咽痛和全身酸痛等症状
D. 提高咳嗽对气道分泌物的清除率

41. 治疗急性上呼吸道感染,伪麻黄碱的作用是()。

42. 治疗急性上呼吸道感染,马来酸氯苯那敏的作用是()。

A. 氢氯噻嗪
B. 卡托普利
C. 氨氯地平
D. 氯沙坦

43. 属于利尿药的是()。

44. 属于钙通道阻滞药的是()。

45. 属于血管紧张素转换酶抑制药的是()。

46. 属于血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂的是()。

- A. 强阿片类药,并可合用非甾体类抗炎药以及辅助镇痛药
B. 弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药,并可联合应用非甾体类抗炎药以及辅助镇痛药
C. 非甾体类抗炎药物(NSAIDs)
D. 强阿片类药,并联合使用双膦酸盐类药物

47. 癌症患者轻度疼痛,可选用()。

48. 癌症患者中度疼痛,可选用()。

- A. 以糖类为主要食物成分和餐后血糖升高的患者
 - B. 2 型糖尿病患者控制高血糖的一线用药和联合用药中的基础用药
 - C. 降低具有心血管高危风险的 2 型糖尿病患者主要心血管不良事件和肾脏事件复合终点发生发展的风险
 - D. 通过刺激胰岛素的早期分泌而降低餐后血糖
49. 二甲双胍在糖尿病指南中推荐作为()。
50. α -糖苷酶抑制剂适用于()。

试卷代号:11475

国家开放大学2024年秋季学期期末统一考试

药物治疗学(本) 试题答案及评分标准

(供参考)

2025 年 1 月

一、单项选择题(每题 2 分,共 80 分)

1. C

2. B

3. C

4. C

5. A
6. C

7. D

8. D

9. A

10. C
11. D

12. D

13. D

14. A

15. A
16. B

17. C

18. B

19. B

20. A
21. C

22. D

23. C

24. B

25. A
26. C

27. B

28. C

29. C

30. C
31. A

32. C

33. A

34. B

35. B
36. C

37. A

38. B

39. C

40. C

二、配伍选择题(每一组有 2—4 题,共用四个备选项。备选项可重复选用,也可不选用。每题只有一个最佳答案。每题 2 分,共 20 分)

41. A

42. B

43. A

44. C

45. B
46. D

47. C

48. B

49. B

50. A