

试卷代号:22624

座位号

国家开放大学2025年春季学期期末统一考试

医药商品营销实务 试题(开卷)

2025年7月

注意事项:

1. 将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后,把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
2. 仔细阅读题目的说明,并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上,写在试题上的答案无效。
3. 用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题,使用铅笔答题无效。

一、名词解释(本题共7题,每题4分,共28分)

1. 处方药
2. 变态反应
3. 半数致死量(LD₅₀)
4. 商业汇票
5. 遮光
6. GLP
7. 蓝帽子标志

二、问答题(本题共6题,每题12分,共72分)

8. 请介绍执业药师的职责。(12分)
9. 药品储存应实行色标管理。请介绍待验药品库(区)、退货药品库(区)、合格药品库(区)、零货称取库(区)、待发药品库(区)、不合格药品库(区)的色标管理颜色。(12分)
10. 请介绍药品养护工作中需要重点养护的品种。(12分)
11. 请介绍胶囊剂的正确服用方法。(12分)
12. 请介绍高脂血症的治疗药物选择。(12分)
13. 请介绍消化性溃疡的健康管理。(12分)

○-○-○

考点名称:

姓名:

学号:

○-○-○

试卷代号:22624

国家开放大学2025年春季学期期末统一考试

医药商品营销实务 试题答案及评分标准(开卷)

(供参考)

2025年7月

一、名词解释(本题共7题,每题4分,共28分)

1. 处方药:处方药指必须凭执业医师或执业助理医师处方,才能购买和使用的药品。
2. 变态反应:变态反应指机体受药物刺激后所发生的异常免疫反应,可引起生理功能障碍或组织损伤。
3. 半数致死量(LD₅₀):半数致死量指使半数实验动物死亡的剂量,可作为药物毒性大小的指标。
4. 商业汇票:商业汇票是企事业单位等签发的,委托付款人在付款日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的一种汇票。
5. 遮光:遮光指用不透光的容器包装,例如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器。
6. GLP:GLP指药物非临床研究质量管理规范,英文全称为 Good Laboratory Practice。
7. 蓝帽子标志:蓝帽子标志是保健食品专有标志,是国家食品药品监督管理总局规定的图案,图案为天蓝色形如“蓝帽子”形状,下有保健食品字样,俗称“蓝帽子标志”。

二、问答题(本题共6题,每题12分,共72分)

8. 请介绍执业药师的职责。(12分)
答:执业药师有如下职责:
(1)执业药师应当遵守执业标准和业务规范,以保障和促进公众用药安全有效为基本准则。执业药师必须严格遵守《药品管理法》及国家有关药品研制、生产、经营、使用的各项法规及政策。对违反《药品管理法》及有关法规、规章的行为或决定,执业药师有责任提出劝告、制止、拒绝执行,并向当地负责药品监督管理的部门报告。(3分)
(2)执业药师在执业范围内负责对药品质量的监督和管理,参与制定和实施药品全面质量管理制度,参与单位对内部违反规定行为的处理工作;负责处方的审核及调配,提供用药咨询与信息,指导合理用药,开展治疗药物监测及药品疗效评价等临床药学工作。(3分)

(22624号)医药商品营销实务答案第1页(共3页)

(3)药品零售企业应当在醒目位置公示《执业药师注册证》,并对在岗执业的执业药师挂牌明示。执业药师不在岗时,应当以醒目方式公示,并停止销售处方药和甲类非处方药。执业药师执业时应当按照有关规定佩戴工作牌。(3分)

(4)执业药师应当按照国家专业技术人员继续教育的有关规定接受继续教育,更新专业知识,提高业务水平。国家鼓励执业药师参加实训培养。(3分)

9. 药品储存应实行色标管理。请介绍待验药品库(区)、退货药品库(区)、合格药品库(区)、零货称取库(区)、待发药品库(区)、不合格药品库(区)的色标管理颜色。(12分)

答:药品贮存时,对不同质量状态药品应实行色标管理。(3分)

其中待验药品库(区)、退货药品库(区)为黄色标识;(3分)

合格药品库(区)、零货称取库(区)、待发药品库(区)为绿色标识;(3分)

不合格药品库(区)为红色标识。(3分)

10. 请介绍药品养护工作中需要重点养护的品种。

答:重点养护品种一般包括:

重点经营品种(2分)、首营品种(2分)、质量不稳定品种(2分)、对温度和避光有特殊储存要求的品种(1分)、效期短的品种(1分)、储存时间长的品种(1分)、有效期不足1年的品种(1分)、有效期内发生过质量问题的品种及(1分)药监部门重点监控的品种(1分)。

11. 请介绍胶囊剂的正确服用方法。(12分)

答:服用胶囊剂时,应用水送服,不宜干吞。(3分)服用胶囊尤其是硬胶囊时,让胶囊在口中与水充分接触使胶囊壳湿润后,仰头吞下,避免胶囊黏附在食管上产生异物感或损伤食管。(3分)如果咽喉内有异物感觉,可尽快服用大量水。(3分)胶囊剂不宜打开服用,尤其是缓控释胶囊和肠溶胶囊绝不能打开服用。(3分)

12. 请介绍高脂血症的治疗药物选择。(12分)

答:(1)他汀类。临床常用药物有洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、阿托伐他汀和瑞舒伐他汀。(3分)

(2)贝特类。常用贝特类药物有吉非贝齐、非诺贝特和苯扎贝特。(3分)

(3)胆固醇吸收抑制剂。依折麦布与他汀类联合应用可有效降低低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平,适用于不能耐受一线调脂药物的患者。(3分)

(4)联合用药。对于一些难治的脂质代谢严重异常的患者,需要同时联合使用血脂调节药物。他汀类+依折麦布:这两类药物分别影响胆固醇的合成和吸收,可产生良好协同作用。他汀类+贝特类:这两者开始合用时宜都用小剂量,可采取晨服贝特类药物、晚服他汀类药物的方式。(3分)

(22624号)医药商品营销实务答案第2页(共3页)

13. 请介绍消化性溃疡的健康管理。(12分)

答:注意消除生活中能引发消化性溃疡的病因。(3分)

(1)生活要有规律,注意休息,避免过度劳累、剧烈运动和精神紧张。(3分)

(2)戒烟、酒。饮食要定量,避免过饱过饥,避免食用粗糙、过冷过热和刺激性食物。(2分)

(3)停用或替换相关药物。服用 NSAID 者尽可能停用,未用 NSAID 者今后慎用。必须使用糖皮质激素等易导致胃黏膜损伤的药物时,应选用损伤较小的制剂或选择性 COX-2 抑制剂,并联用抑酸药或胃黏膜保护药。(2分)

(4)对明显伴有焦虑、抑郁等神经症状的患者,应鉴别疾病的因果关系,并给予针对性治疗。(2分)